Einsatz von Schluckgel und Götterspeise bei Patienten mit neurodegenerativem Parkinson-Syndrom und einer Medikamentendysphagie

– Evaluation der Schluckeffizienz und -sicherheit

Nicole Scherbak¹, B. Sc.; Prof. Dr. Barbara Schneider¹; Prof. Dr. Tobias Warnecke²

¹Hochschule Osnabrück, ²Klinikum Osnabrück

HINTERGRUND

Etwa 30 % bis 70 % der Patienten mit Parkinson sind von einer Medikamentendysphagie betroffen. Die Folge sind Medikationsfehler resultierend aus Abweichungen von Behandlungsplänen, Modifikationen der Medikamentenform und dem Einsatz ungeeigneter Schluckhilfen. Der Weiteren kann eine Medikamentendysphagie bei Patienten mit Parkinson zu einem no-on-oder delayed-on-Phänomen führen. Die Patienten stehen vor dem Problem, dass die Einnahme ganzer Tabletten ineffizient oder lebensbedrohlich sein kann, während die Modifikation von Medikamenten oder die Verwendung ungeeigneter Schluckhilfen die Pharmakokinetik verändert. Zur Hilfe bei einer beeinträchtigten Medikamenteneinnahme wurde das Schluckgel Gloup Forte entwickelt, das eine einfachere Verabreichung von Medikamenten bei weniger Modifikationen ermöglicht und die pharmakologische Wirkung nicht beeinflusst. Jedoch ist die aktuelle Datenlage zur Effektivität von Schluckgelen im Vergleich zu anderen dickflüssigen Lebensmitteln sowie zur Anwendung bei Patienten mit neurodegenerativem Parkinson-Syndrom unzureichend.

FRAGESTELLUNG

Inwiefern eignet sich der Einsatz von Schluckgel mit der Konsistenzstufe 4 nach IDDSI (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative) bei Patienten mit neurodegenerativem Parkinson-Syndrom und einer oropharyngealen Dysphagie im Vergleich zum Einsatz von Götterspeise (IDDSI 4) als Hilfe beim Schlucken von Tabletten in Bezug auf die Schluckeffizienz und -sicherheit?

Unterfragen:

1. Wie bewerten die Untersucher den Einsatz von Schluckgel im Vergleich zu Götterspeise hinsichtlich der Schluckeffizienz und -sicherheit auf der Skala „Classification of Dysphagia for Medication“ nach Labeit et al. (2022)?
2. Wie bewerten die Patienten den Einsatz von Schluckgel im Vergleich zu Götterspeise hinsichtlich der Schluckeffizienz und -sicherheit auf dem Patientenfragebogen?

METHODE

Die Schluckhilfen Götterspeise und das Schluckgel Gloup Forte wurden in Bezug auf die Outcomes Schluckeffizienz und Schlucksicherheit an zehn Patienten mit neurodegenerativem Parkinson-Syndrom im Rahmen einer flexiblen endoskopischen Schluckuntersuchung (FEES) evaluiert. Die objektive Bewertung erfolgte anhand von Kriterien nach Labeit et al. (2022). Zudem wurde eine subjektive Einschätzung beider Parameter durch die Probanden ergänzt.

Stichprobe:

Merkmal	Probanden
Geschlecht	
Männlich (n, %)	10 (100%)
Weiblich (n, %)	0 (0%)
Alter (Md, IQR)	78,5 (62 - 80)
Parkinson-Syndrom (PS)	
idiopathisches PS (n, %)	7 (70%)
atypisches PS (n, %)	3 (30%)
MDS - UPDRS Score (Md, IQR)	31 (21,5 - 49)
DIGEST Score (Md, IQR)	2 (1 - 2)

Messinstrumente:

Objektive Evaluation Classification of Dysphagia for Medication (Labeit et al., 2022)		
Ordinale Skala	Schluckeffizienz	Schlucksicherheit
0: keine Beeinträchtigung	Das Medikament wird beim ersten Schluckversuch vollständig geschluckt, ohne sich aufzulösen.	Das Medikament wird geschluckt, ohne dass die Gefahr von Freisetzen oder der Aspiration besteht.
1: leichte Beeinträchtigung	Das Medikament wird beim ersten Versuch nicht geschluckt, lässt sich aber bei weiteren Versuchen leicht schlucken, ohne sich aufzulösen.	Das Medikament oder Wasser gelangt vorwiegend vor Auslösen des Schluckreflexes in eine Röhre oder verbleibt nach dem ersten Schluckversuch prolongiert im Rachen, ohne dass es zu einer Penetration oder Aspiration kommt.
2: mäßige Beeinträchtigung	Das Medikament löst vorwiegend im Oropharynx fest und kann nur durch intensive Schluckversuche (z.B. Versuche oder zusätzliches Wassertrinken) gelöst werden und/oder es kommt zu minimalen Auflockerungserscheinungen des Medikamentenbogens auf der Schleimhaut.	Das Medikament oder das Wasser dringt in den Larynx ein, wird aber durch Schutzreflexe wirksam entfernt.
3: schwere Beeinträchtigung	Das Medikament kann nicht vollständig geschluckt werden und löst sich teilweise auf.	Das Medikament oder Wasser dringt in den Larynx ein und wird trotz Schutzreflexen nicht entfernt.
4: sehr schwere Beeinträchtigung	Das Medikament kann nicht geschluckt werden und/oder löst sich vollständig auf.	Das Medikament oder Wasser dringt in den Larynx ein, ohne dass es zu Schutzreflexen kommt, oder es kommt zu Aspirationsgefahr.

Subjektive Evaluation Patientenfragebogen					
Ich bitte Sie jetzt, die Schluckversuche aus der Untersuchung zu bewerten. Geben Sie an, inwiefern Sie den folgenden Aussagen zustimmen.					
Fragen zum Schlucken der Tablette mit Götterspeise					
1. Mit der Götterspeise kann ich die Tablette nicht vollständig schlucken.	Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme zu	
2. Ich kann die Tablette mit Götterspeise schlucken ohne dass ich husten oder mich räuspern muss.	Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme zu	
3. Ich fühle mich beim Schlucken der Tablette mit Götterspeise unsicher.	Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme zu	
4. Mit Hilfe der Götterspeise habe ich nicht das Bedürfnis, die Tablette zusätzlich zu zerleinern.	Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme zu	

ERGEBNISSE

Objektive Evaluation

Abbildung 1. Beeinträchtigung der Schluckeffizienz nach objektiven Bewertungskriterien von Labeit et al. (2022).

Subjektive Evaluation

Abbildung 2. Zustimmung zur Aussage „Mit der Götterspeise/ dem Schluckgel kann ich die Tablette nicht vollständig schlucken.“

Abbildung 3. Zustimmung zur Aussage „Mit Hilfe der Götterspeise/ des Schluckgels habe ich nicht das Bedürfnis, die Tablette zusätzlich zu zerleinern.“

Schlucksicherheit

Abbildung 4. Beeinträchtigung der Schlucksicherheit nach objektiven Bewertungskriterien von Labeit et al. (2022).

Abbildung 5. Zustimmung zur Aussage „Ich kann die Tablette mit Götterspeise/ Schluckgel schlucken, ohne dass ich husten oder mich räuspern muss.“

Abbildung 6. Zustimmung zur Aussage „Ich fühle mich beim Schlucken der Tablette mit Götterspeise/ Schluckgel unsicher“

FAZIT

Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl Schluckgel und als auch Götterspeise für die Patienten mit neurodegenerativem Parkinson-Syndrom der vorliegenden Stichprobe hinsichtlich der Schluckeffizienz und -sicherheit **im Wesentlichen geeignet** waren und sich als **vergleichbare Hilfsmittel** erwiesen. Dadurch kann ggf. das Risiko von Medikationsfehler oder eines no-on oder delayed-on-Phänomen verringert werden. Allerdings sind die Ergebnisse aufgrund der nicht repräsentativen Stichprobe nur eingeschränkt übertragbar und ein möglicher Einfluss der Götterspeise auf die pharmakologische Wirkung bleibt unklar.

KONTAKT

Nicole Scherbak
Hochschule Osnabrück
E-Mail: nicolescherbak@gmail.com

LITERATUR

Hier QR-Code

Poster PDF

Hier QR-Code